



# Lista de întrebări

Specialitatea: FARMACIE

- 1. Este indicat/ă în diareea postantibiotice:**
  - a) clorchinaldol
  - b) furazolidon
  - c) *Saccharomyces boulardi*
- 2. Masa învelișului drajeurilor nu trebuie să fie:**
  - a) mai mică decât masa nucleului
  - b) egală cu masa nucleului
  - c) mai mare decât masa nucleului
- 3. Metodologia de reatestare a competenței profesionale este elaborată de către:**
  - a) Ministerul Sănătății
  - b) Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România
  - c) Ministerul Educației
- 4. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de către:**
  - a) organizațiile sindicale.
  - b) Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moșelor și Asistenților Medicali din România
  - c) Ministerul Educației
- 5. Selectați antihipertensivul antagonist al receptorilor alfa-adrenergici:**
  - a) doxazosin
  - b) amlodipină
  - c) metoprolol
- 6. Când se prepară soluții cu substanțe toxice în cantități mai mici de 50 mg, se folosesc:**
  - a) balanțe speciale
  - b) soluții titrate ale acestor substanțe
  - c) pulberi titrate
- 7. Este un inhibitor de enkefalinază indicat în diareea acută:**
  - a) racecadotril (Hidrasec)
  - b) nistatina
  - c) *Saccharomyces boulardi*
- 8. Este utilizat/ă în tratamentul hipertensiunii arteriale:**
  - a) pseudoefedrina
  - b) valsartan

c) metformina

**9. Selectați contraindicația pentru morfină:**

- a) dureri postoperatorii
- b) infarct miocardic
- c) deprimare respiratorie

**10. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:**

- a) documentul de studii care atestă formarea în profesie
- b) avizul de liberă practică
- c) certificatul de membru

**11. Când masa pulberii depășește 20g, este obligatorie:**

- a) cernerea finală
- b) sterilizarea
- c) repartizarea în doze unitare

**12. Care din medicamentele următoare are efecte bronhodilatatoare?**

- a) albuterol
- b) metoprolol
- c) propranolol

**13. Care din următoarele sancțiuni poate fi aplicată asistenților medicali generaliști, moaşelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România:**

- a) avertisment scris
- b) suspendarea dreptul de liberă practică până la realizarea numărului minim de credite
- c) suspendarea dreptul de liberă practică pe o perioadă de 6 luni

**14. Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașa și de asistent medical sunt:**

- a) experiența profesională, responsabilitatea și cinstea
- b) competența, corectitudinea și comunicarea
- c) profesionalismul, cooperarea și empatia

**15. Aplicarea locală a unguentului cu propolis și cetil- piridinclorură are ca rezultat:**

- a) îmbunătățirea evoluției clinice a plăgilor
- b) întreținerea sângerării plăgii
- c) creșterea cantității secreției purulente

**16. Este indicată în anemia megaloblastică:**

- a) vitamina D
- b) vitamina B12
- c) vitamina E

**17. Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar,**

**activitățile profesionale:**

- a) se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI
- b) se transmit Ministerului Sănătății
- c) nu există obligația de transmitere a acestor informații

**18. Care din următoarele antibiotice, deși administrat în mod uzual pe cale injectabilă, se poate administra și oral, dar nu se absoarbe în tubul digestiv:**

- a) rifampicina
- b) colistin (colimicină, polimixină E)
- c) tetraciclina

**19. Selectați medicamentul anticonvulsivant din grupa benzodiazepinelor:**

- a) tiopental
- b) acid valproic
- c) clonazepam

**20. Este indicat/ă în dismenoree:**

- a) metamizol
- b) morfina
- c) fentanil

**21. Este contraindicat la copiii cu diaree, din cauza riscului de insuficiență renală acută:**

- a) metoclopramid
- b) paracetamol
- c) ibuprofen

**22. Este contraindicat/ă în hiperkaliemie:**

- a) furosemid
- b) spironolactonă
- c) hidroclorotiazidă

**23. Avizul anual se acordă:**

- a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv
- b) fără a fi necesară încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională
- c) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni

**24. Suspensiile sunt destinate administrării:**

- a) doar externe
- b) doar interne
- c) interne sau externe

**25. Care dintre următoarele medicamente inhibă enzima de conversie a angiotensinei:**

- a) indapamid
- b) enalapril
- c) nebivolol

**26. Bazele de supozitor pot fi:**

- a) doar hidrosolubile
- b) liposolubile sau hidrosolubile
- c) doar liposolubile

**27. Cum se numesc emulsiile în compoziția cărora intră săpunuri și care sunt destinate aplicării pe piele:**

- a) creme
- b) emulsii uleioase
- c) linimente

**28. Selectați medicamentul care nu are efecte antiemetice:**

- a) granisetron
- b) metoclopramid
- c) mebeverină

**29. Profesia de asistent medical generalist, de moașă și respectiv de asistent medical se exercită pe teritoriul României:**

- a) numai în regim salarial
- b) în regim independent
- c) în regim salarial și/sau independent

**30. Care este autoritatea ce are ca atribuție recunoașterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:**

- a) Ministerul Sănătății
- b) Ministerul Muncii
- c) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

**31. Din câte faze lichide nemiscibile sunt constituite emulsiile:**

- a) 2
- b) 4
- c) 3

**32. Picăturile pentru ochi mai sunt cunoscute și sub denumirea de:**

- a) băi oculare
- b) colire
- c) unguente oculare

**33. Pentru infuzare, pentru fiecare gram de produs vegetal, se folosesc în scopul umectării, 3 ml apă, cu excepția produselor vegetale care conțin:**

- a) uleiuri volatile
- b) taninuri
- c) mucilagii

**34. Ca și omeprazol, esomeprazol este contraindicat în:**

- a) reflux gastroesofagian
- b) sarcină și alăptare
- c) sindrom Zollinger- Ellison

**35. Este indicat/ă în tratamentul bolii Parkinson:**

- a) cinarizina
- b) levodopa
- c) lamotrigina

**36. La epurarea medicamentelor din organism, cea mai mare importanță o prezintă:**

- a) intestinul
- b) pielea
- c) rinichii

**37. Augmentin este o combinație de amoxicilină cu:**

- a) acid clavulanic
- b) piperacilină
- c) sulbactam

**38. Care din următoarele opioide este de sinteză:**

- a) morfina
- b) tramadol
- c) codeina

**39. Este indicată în rahitism:**

- a) vitamina B6
- b) vitamina C
- c) vitamina D

**40. Identificați afirmația falsă despre miere:**

- a) după depozitare, conține un număr de cristale care duc la o cristalizare fină
- b) pentru prepararea medicamentelor apifitoterapice se utilizează doar mierea polifloră
- c) este un produs natural

**41. Substanțele inductoare (cu efect stimulant asupra enzimelor):**

- a) nu afectează metabolizarea unor medicamente
- b) intensifică metabolizarea unor medicamente
- c) inhibă metabolizarea unor medicamente

**42. Fenobarbitalul este contraindicat în:**

- a) epilepsie parțială
- b) ictere congenitale cronice cu bilirubină neconjugată
- c) insuficiență respiratorie severă

**43. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:**

- a) Ministerului Sănătății
- b) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Educației

**44. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali exercită profesia pe baza:**

- a) certificatului de membru și a avizului anual
- b) certificatului de membru
- c) certificatului de membru și asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională

**45. Acțiunea terapeutică a boabelor de cafea imprimată de cafeină, constă în:**

- a) creșterea capacității intelectuale
- b) acțiune hiperglicemiantă prin favorizarea eliberării postprandiale de insulină
- c) acțiune hiperglicemiantă prin inhibarea alfa-amilazei

**46. Este un medicament antiacid:**

- a) simeticona
- b) bicarbonat de sodiu
- c) diosmectită (Smecta)

**47. Care din următoarele, nu reprezintă o cale de eliminare a medicamentelor din organism:**

- a) eliminare renală
- b) eliminare prin bilă
- c) eliminare prin esofag

**48. Selectați medicamentul cu efect antitusiv:**

- a) butamirat (Sinecod)
- b) lactuloză
- c) acid ursodeoxicolic

**49. Comprimatele acoperite al căror nucleu se acoperă cu unul sau mai multe straturi constituite din zahăr, se numesc:**

- a) comprimate enterosolubile
- b) comprimate filmate
- c) drajeuri

**50. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal:**

- a) se elaborează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății
- b) se elaborează de către Biroul Executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin hotărâre a Consiliului national al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) se elaborează de către Ministerul Educației și se aprobă de către Ministerul Sănătății

**51. La prepararea soluțiilor, substanțele cu miros puternic se adaugă:**

- a) oricând
- b) la sfârșit
- c) la început

**52. Este inhibitor al pompei de protoni și indicat în ulcerul gastroduodenal, medicamentul:**

- a) omeprazol
- b) drotaverina
- c) famotidină

**53. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:**

- a) nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală
- b) exclude răspunderea civilă
- c) exclude răspunderea penală

**54. Suspensiile care se aplică pe plăgi sau arsuri se prepară prin metode care le asigură:**

- a) fluiditatea
- b) un miros adecvat
- c) sterilitatea

**55. Educația continuă se realizează de către:**

- a) Ministerul Educației
- b) furnizori acreditați, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Sănătății

**56. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:**

- a) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
- b) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală
- c) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului

**57. Pe lângă calea rectală, supozitoarele pot fi administrate și pe cale:**

- a) transcutanată
- b) auriculară
- c) vaginală

**58. Formoterol este un medicament indicat în:**

- a) HTA
- b) ulcer gastric
- c) astm bronșic

**59. Selectați vitamina hidrosolubilă:**

- a) vitamina D
- b) vitamina B12
- c) vitamina E

**60. Este indicat în tratamentul HTA și al unor aritmii cardiace:**

- a) enalapril
- b) captopril
- c) metoprolol

**61. Face parte din grupul diureticelor de intensitate redusă:**

- a) hidroclorotiazidă
- b) furosemid
- c) papaverină

**62. Unguentele sunt preparate farmaceutice:**

- a) solide
- b) lichide

- c) semisolide

**63. Senna este contraindicată:**

- a) înaintea intervențiilor chirurgicale
- b) în suferințe abdominale nediagnosticate
- c) în constipația cronică

**64. Colchicina se utilizează în:**

- a) tratamentul colicilor renale
- b) ca analgezic în dureri traumatice
- c) tratamentul simptomatic al crizelor acute de gută

**65. Agranulocitoza este un efect advers specific pentru:**

- a) metamizol
- b) paracetamol
- c) acid acetilsalicilic

**66. Ceara de albine se prezintă sub forma unei:**

- a) mase lichide de culoare galbenă
- b) mase solide de culoare brună
- c) mase solide de culoare galbenă

**67. Pulberile se pot administra:**

- a) pe cale orală sau pe piele sau pe mucoase
- b) doar pe piele sau pe mucoase
- c) doar pe cale orală

**68. La comprimate, adăugarea corectorilor de gust și de miros este admisă pentru:**

- a) comprimatele care se mențin în gură
- b) comprimatele acoperite
- c) orice comprimate

**69. Selectați contraindicația pentru oxicodonă:**

- a) dureri severe
- b) ileus paralic
- c) fracturi costale

**70. Identificați diureticul de ansă:**

- a) furosemid
- b) spironolactonă
- c) indapamid

**71. Este indicat/ă pentru primul palier al scării analgezice OMS:**

- a) morfina
- b) tramadolul
- c) acidul acetilsalicilic

**72. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de tratament asupra unui minor, consimțământul:**

- a) este optional



- b) trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență
- c) doar în situația de urgență

**73. Este indicat în tratamentul grețurilor și vărsăturilor produse de antitumorale:**

- a) butilscolopolamoniu
- b) ondansetron
- c) simeticonă

**74. Dacă faza dispersată depășește 25% din masa unguentului, unguentele- suspensii sunt denumite:**

- a) linimente
- b) creme
- c) paste

**75. Este indicat/ă pentru favorizarea expectorației, inclusiv în mucoviscidoză:**

- a) oxeladin
- b) acetilcisteină
- c) codeină

**76. Alegerile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară:**

- a) anual
- b) o dată la 4 ani
- c) o dată la 5 ani

**77. Prezintă efecte teratogene în urma administrării la femeia însărcinată:**

- a) paracetamolul
- b) vitamina B12
- c) unele antiepileptice

**78. Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate de către Consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România sunt următoarele:**

- a) muștrarea și avertismentul
- b) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România
- c) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România

**79. Care dintre următoarele medicamente este un laxativ de volum?**

- a) semințe de Psylla (Ispaghula)
- b) ulei de parafină
- c) Senna

**80. Alegeți medicamentul antitusiv:**

- a) xilometazolină
- b) acetilcisteină
- c) codeină

- 81. Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:**
- suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate
  - mustrare
  - avertisment
- 82. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate:**
- cu aprobarea conducătorului unității medicale
  - dacă legea o cere în mod expres
  - oricărei persoane interesate
- 83. Care dintre următoarele reacții adverse este specifică paracetamolului administrat în doze mari:**
- detresă respiratorie
  - hepatotoxicitate
  - agranulocitoză
- 84. Selectați vitamina liposolubilă:**
- vitamina B2
  - vitamina B1
  - vitamina A
- 85. Care din următoarele medicamente se utilizează ca laxativ de contact:**
- loperamid
  - furazolidon
  - bisacodil
- 86. Sunt contraindicate la copii, deoarece ar putea afecta cartilajele de creștere:**
- macrolidele
  - fluorochinolonele
  - penicilinele
- 87. Următoarele afirmații despre propolis sunt adevărate, cu excepția:**
- este un produs secundar al stupului
  - are proprietăți antiseptice față de bacterii, fungi și drojdii
  - diminuează calitățile unor extracte de plante ce intră în alcătuirea acelorași medicamente apifitoterapice
- 88. Pentru colirele uleioase, conform FR X, ca vehicul se folosește:**
- uleiul de măsline
  - uleiul de floarea soarelui neutralizat
  - uleiul de in
- 89. Poate declanșa reacții alergice de tip I (anafilactice):**
- vitamina C
  - penicilina
  - uleiul de parafină
- 90. Selectați anticonvulsivantul indicat în nevralgia de trigemen:**
- carbamazepină

- b) clonazepam
- c) etosuximidă

**91. La soluțiile extractive apoase, masa produsului vegetal luat în lucru este, în general, de:**

- a) 20%
- b) 10%
- c) 6%

**92. Paracetamol este contraindicat în:**

- a) febră
- b) dureri articulare
- c) insuficiență hepatică

**93. Antihistaminicul H2 indicat în ulcer gastric și duodenal este:**

- a) nizatidina
- b) pantoprazol
- c) subcitrát de bismut

**94. Este activă pe numeroși germeni gram- negativi:**

- a) penicilina G
- b) gentamicina
- c) eritromicina

**95. Conform FR X, comprimatele pentru administrare pe cale orală se înghit ca atare sau:**

- a) după dizolvare sau dispersare prealabilă în apă
- b) după dizolvare sau dispersare prealabilă în ulei
- c) după dizolvare sau dispersare prealabilă în alcool

**96. Selectați medicamentul antiparkinsonian din grupul anticolinergicilor:**

- a) propranolol
- b) trihexifenidil (trihexafenidil, Romparkin)
- c) bromocriptină

**97. Mierea are aplicații terapeutice în:**

- a) în combaterea somnolenței
- b) boala ulceroasă
- c) diaree

**98. Selectați antibioticele care distrug peretele celular al bacteriilor și determină liza bacteriană:**

- a) eritromicina
- b) peniciline
- c) tetraciline

**99. Industria farmaceutică folosește ca ceară autentică:**

- a) ceara de albine naturală
- b) ceara de albine amestecată cu parafină
- c) ceara de albine combinată cu colofoniu

**100 Se poate utiliza în tratamentul ulcerului gastric și al esofagitei de reflux:**

.

- a) papaverina
- b) lactuloza
- c) lansoprazol