



Lista de întrebări

Specialitatea: MOAȘĂ

- 1. Reglarea volumului lichidului amniotic se face prin:**
 - a) Deglutiția fetală și excreția fetală.
 - b) Sistemul excretor matern.
 - c) Tractul respirator fetal.
- 2. În primele săptămâni de sarcină, estrogenii sunt produși în special de:**
 - a) Tiroidă.
 - b) Corpul galben.
 - c) Membrane și placentă.
- 3. Printre mecanismele de adaptare ale aparatului circulator în sarcină se numără:**
 - a) Ritmul cardiac crește cu 20 de bătăi/minut.
 - b) Tensiunea arterială sistolică crește cu 30 mm Hg.
 - c) Ritmul cardiac scade cu 20 bătăi/minut.
- 4. Sub denumirea de avort sportan înțelegem:**
 - a) Eliminarea produsului de concepție în ultimul trimestrul al sarcinii.
 - b) Naștere la termen cu făt mort.
 - c) Eliminarea produsului de concepție în primul trimestrul al sarcinii.
- 5. Printre hormonii cu rol în mamogeneză se numără:**
 - a) Cortizolul.
 - b) Relaxina.
 - c) Prolactina.
- 6. Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România, este dovedită prin:**
 - a) certificatul de membru
 - b) documentul de studii care atestă formarea în profesie
 - c) avizul de liberă practică
- 7. Cordonul ombilical are de obicei:**
 - a) Două vene și o arteră.
 - b) Două artere și o venă.
 - c) Două artere și două vene.
- 8. Lichidul amniotic:**
 - a) Are rol în sinteza proteinelor și mineralelor
 - b) Este un produs biologic care umple cavitatea amniotică
 - c) Secretă gonadotropină corionica umana (hCG)

9. Vaccinarea antigripală în sarcină:

- a) Este indicată femeilor cu risc crescut de complicații ale gripei.
- b) Este contraindicată.
- c) Este permisă doar în primul trimestru.

10. Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia nu este obligatoriu:

- a) pentru recoltarea, păstrarea sau folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului
- b) când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență
- c) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală

11. În prezentația craniană focarul de ascultație maximă a bățăilor cordului fetal se găsește:

- a) La nivelul fundului uterin.
- b) De partea spatelui fetal, pe linia spinoombilicală.
- c) Paraombilical lateral.

12. Sexul genetic este determinat:

- a) În momentul fertilizării
- b) În momentul actului sexual
- c) În momentul nidației

13. Anatomia perineului cuprinde, cu excepția:

- a) Mușchii masticatori.
- b) Sfincterul uretral.
- c) Sfincterul anal extern.

14. Printre fenomenele active ale nașterii se numără:

- a) Contrakția uterină.
- b) Formarea pungii apelor.
- c) Dispariția mișcărilor fetale.

15. Valorile esențiale ale profesiei de asistent medical generalist, de moașa și de asistent medical sunt:

- a) competența, corectitudinea și comunicarea
- b) profesionalismul, cooperarea și empatia
- c) experiența profesională, responsabilitatea și cinstea

16. Consultațiile prenatale trebuie efectuate:

- a) În momentul declanșării travaliului de sarcină.
- b) Trimestrial.
- c) Săptămânal după 36 de săptămâni.

17. Progesteronul este un steroid secretat de celule din:

- a) Granuloasa corpului galben, care ia naștere din folicul după ovulație.
- b) Lichidul amniotic.
- c) Colul uterin.

18. Metodologia de reatestare a competenței profesionale este elaborată de către:

- a) Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali

din România

- b) Ministerul Educației
- c) Ministerul Sănătății

19. Teratospermia reprezintă:

- a) Număr normal de spermatozoizi, fără morfologie anormală.
- b) Mai puțin de 30% dintre spermatozoizi cu morfologie normală a capului.
- c) Volum insuficient de lichid spermatic.

20. Manifestările clinice ale sinechiilor uterine sunt, cu excepția:

- a) Sterilitate.
- b) Polimenoree.
- c) Hipomenoree.

21. Hormonul lactogen placentar (HPL) este evidențiable în serul gravidei:

- a) Din trimestrul III.
- b) Din trimestru II.
- c) După 3 – 4 săptămâni de sarcină.

22. Durata medie a menstruației este:

- a) 28 de zile.
- b) 5 zile.
- c) 22 – 35 de zile.

23. Informațiile cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale:

- a) nu există obligația de transmitere a acestor informații
- b) se transmit Ministerului Sănătății
- c) se transmit autorităților competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene prin alertă în cadrul IMI

24. Fibromul uterin este:

- a) Tumoră de tip malign.
- b) Tumoră benignă dezvoltată la nivelul uterului.
- c) Tumoră benignă dezvoltată la nivelul ovarului.

25. Cauzele de apariție a prolapsului genital sunt, cu excepția:

- a) Menopauza.
- b) Parteneri multipli.
- c) Obezitatea.

26. Alegerile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară:

- a) o dată la 5 ani
- b) anual
- c) o dată la 4 ani

- 27. Zgomotele cordului fetal sunt regulate, bine bătute, ritmice și au o frecvență de:**
- a) 80 – 100 bătăi / minut.
 - b) 120 – 160 bătăi / minut.
 - c) 100 – 120 bătăi / minut.
- 28. În primele 2 ore după naștere (expulzie), TA și pulsul pacientei se măsoară la un interval de:**
- a) 15 minute.
 - b) Două ore.
 - c) 30 minute.
- 29. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:**
- a) nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală
 - b) exclude răspunderea civilă
 - c) exclude răspunderea penală
- 30. Miometrul este format din:**
- a) Cinci straturi.
 - b) Trei straturi.
 - c) Un strat.
- 31. Profesia de asistent medical generalist, de moașă și respectiv de asistent medical se exercită pe teritoriul României:**
- a) numai în regim salarial
 - b) în regim salarial și/sau independent
 - c) în regim independent
- 32. Labiile mari sunt:**
- a) Formațiuni erectile cu formă ovoidă.
 - b) Două cute largi de grăsime acoperite cu tegument, conținând foliculi piloși, glande sebacee și sudoripare.
 - c) Sunt pliuri tegumentare de țesut fibroconjunctiv cu rol în stimularea ovulației.
- 33. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal:**
- a) se elaborează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății
 - b) se elaborează de către Ministerul Educației și se aprobă de către Ministerul Sănătății
 - c) se elaborează de către Biroul Executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin hotărâre a Consiliului national al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- 34. Pentru a scădea riscul transmiterii bolii prin contact sexual, este necesară:**
- a) Ligatura tubară.
 - b) Reducerea numărului de parteneri sexuali și folosirea metodelor contraceptive de barieră.
 - c) Vasectomia.
- 35. Chistul ductului glandei Skene:**
- a) Este localizat în apropierea meatului uretral distal.
 - b) Diagnosticul diferențial se face cu chistul de ovar.
 - c) Determină prurit.

36. Amniocenteza este o metodă de diagnostic folosită pentru testarea genetică și se realizează:

- a) Între 8 - 10 săptămâni de sarcină.
- b) La 32 săptămâni de sarcină.
- c) Între 15 – 20 săptămâni de sarcină.

37. Sterilizarea chirurgicală masculină (vasectomia):

- a) Nu scade performanțele sexuale.
- b) Nu se recomandă bărbaților cu vârstă peste 50 de ani.
- c) Este cea mai frecventă metodă contraceptivă utilizată de bărbați.

38. Vulvovaginita herpetică:

- a) Prezintă leziuni primare care persistă 6 – 8 luni.
- b) Se manifestă prin leucoree abundentă, de culoare albă și fără miros.
- c) Este o afecțiune cu transmitere sexuală.

39. Care este autoritatea ce are ca atribuție recunoașterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană:

- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) Ministerul Muncii
- c) Ministerul Sănătății

40. Lichidul amniotic are rol în:

- a) Creșterea concentrației de sodiu în organismul matern.
- b) Protecția mecanică fătului.
- c) Stabilirea datei probabile a nașterii.

41. Spermatozoidul este constituit structural din:

- a) Membrană și nucleu.
- b) Cap, gat, piesă intermediară și coadă.
- c) Aminoacizi și enzime.

42. Vulvovaginita micotică prezintă ca simptome:

- a) O secreție abundentă de culoare roșie.
- b) Disurie.
- c) Vezicule cu conținut clar.

43. Care din următoarele sancțiuni poate fi aplicată asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

- a) avertisment scris
- b) suspendarea dreptul de liberă practică pe o perioadă de 6 luni
- c) suspendarea dreptul de liberă practică până la realizarea numărului minim de credite

44. Printre investigațiile paraclinice din cursul sarcinii se numără:

- a) Histerosalpingografia.
- b) Ecografia.

c) Colposcopia.

45. Menstruația este denumită ca:

- a) Eliminarea periodică a endometrului progestativ însoțit de sângerare.
- b) Eliminarea stratului bazal al endometrului prin sângerare pe cale vaginală.
- c) Perioada ovulației.

46. Avantajele sterilizării chirurgicale cuprind:

- a) Nu necesită controale periodice.
- b) Protejează împotriva cancerului de endometru.
- c) Este o metodă non invazivă, ușor de abordat.

47. Musculatura perineală profundă este reprezentată de:

- a) Ridicătorii anali.
- b) Sternocleidomastoidian.
- c) Abdominal drept.

48. Tehnica palpării obstetricale (Leopold) cuprinde:

- a) 6 timpi.
- b) 2 timpi.
- c) În timpul II se delimitează înălțimea fundului uterin.

49. Locul de debut a cancerului de col uterin este:

- a) Zona scuamo-cilindrică.
- b) Ovarul.
- c) Trompa uterină.

50. Diagnosticul paraclinic, în sarcina extrauterină, se bazează pe:

- a) Test antigen rapid Covid 19.
- b) Test imunologic de sarcină pozitiv.
- c) Prezența anticorpilor împotriva rujeolei.

51. Disgravidia emetizantă se caracterizează prin:

- a) Contractii uterine dureroase, cefalee.
- b) Febră, frison, stare generală alterată.
- c) Grețuri, vărsături, sialoree, intoleranță digestivă.

52. În timpul sarcinii organismul matern suferă o serie de modificări:

- a) Creșterea în greutate este de aproximativ 30 kg.
- b) Pielea devine violacee.
- c) Crește volumul sanguin până în săptămâna 32-34.

53. Scorul Apgar stabilește

- a) Starea funcțiilor vitale ale nou născutului la naștere.
- b) Evoluția maternă după naștere.
- c) Greutatea fătului.

54. În sarcina extrauterină diagnosticul paraclinic se bazează pe:

- a) Histeroscopie.
- b) Test imunologic de sarcină pozitiv.

- c) Examen cu valve.

55. La 12 săptămâni de sarcină, fătul:

- a) Are aproximativ 7,5 cm și cântărește în jur de 18 g.
- b) Are aproximativ 25 cm și cântărește în jur de 500 g.
- c) Are aproximativ 48 cm și cântărește în jur de 3000 g.

56. Printre metodele naturale de planificare familială se numără:

- a) Metoda temperaturii bazale.
- b) Utilizarea spermicidelor.
- c) Utilizarea pilulelor contraceptive.

57. Pe fața fetală a placentei:

- a) Se găsesc vasele spiralate.
- b) Se inseră cordonul ombilical.
- c) Se inseră membranele.

58. Educația continuă se realizează de către:

- a) Ministerul Educației
- b) furnizori acreditați, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- c) Ministerul Sănătății

59. Vascularizația vaginului este asigurată de:

- a) Ramuri din artera femurală.
- b) Ramuri din artera uterină.
- c) Aorta abdominală.

60. În sarcina la termen volumul lichidului amniotic este de:

- a) 1800 ml.
- b) 800 ml.
- c) 200 ml.

61. Amniocenteza este:

- a) O metodă de diagnostic invazivă.
- b) O investigație de rutina efectuată în primul trimestru de de sarcină.
- c) O metodă de diagnostic non invazivă.

62. Printre modificările tegumentare în sarcină se numără:

- a) Decolorarea tegumentelor de la nivelul areolei mamare.
- b) Apariția pruritului în zona vulvară.
- c) Cloasma gravidică și vergeturile.

63. Cordonul ombilical:

- a) Are o lungime în medie de 50 cm, diametrul de 1,5 cm, și se inseră de obicei în centrul placentei.
- b) Are o lungime în medie de 80 cm., diametrul de 1,5 cm și se inseră de obicei pe fața maternă a placentei.
- c) Are o lungime în medie de 30 cm, diametrul de 2 cm și este acoperit de amnios cu aspect mat.

64. Sindromul premenstrual:

- a) Este mai frecvent între 18 și 35 de ani.
- b) Se întâlnește la peste 90% din femei.
- c) Apare doar la adolescente.

65. În prezența pelvină:

- a) Diametrul de angajare este diametrul bispinos.
- b) Fătul se prezintă la strâmtoarea superioară cu occiputul.
- c) Fătul se prezintă la strâmtoarea superioară cu pelvisul.

66. Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu:

- a) avertisment
- b) muștrare
- c) suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate

67. În vederea efectuării tehnicilor și/sau a manevrelor de îngrijire și/sau de tratament asupra unui minor, consimțământul:

- a) trebuie obținut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepția situațiilor de urgență
- b) este opțional
- c) doar în situația de urgență

68. Ciclul menstrual are o durată medie de aproximativ:

- a) 28 de zile.
- b) 5 zile.
- c) 14 zile.

69. Elementele subiective relatate de femeia gravidă cuprind:

- a) Sialoree.
- b) Durere abdominală.
- c) Cefalee și prurit .

70. Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate de către Consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt următoarele:

- a) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) muștrarea și avertismentul
- c) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

71. Este considerată metodă contraceptivă de barieră:

- a) Prezervativul.
- b) Ligaturarea tubară.
- c) Pilule cu conținut de progesteron.

72. Fecundația este procesul de fuziune a spermatozoidului cu ovulul și are loc, în majoritatea cazurilor, în:

- a) În vagin.
- b) În uter.
- c) Treimea superioară a trompei.

73. Durata gestației pentru specia umană este de aproximativ:

- a) 200 – 250 zile.
- b) 270 – 280 zile.
- c) 280 - 320 zile.

74. Tulburările în minus ale ciclului menstrual sunt:

- a) Menometroragia.
- b) Polimenoreea.
- c) Spaniomenoreea.

75. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali exercită profesia pe baza:

- a) certificatului de membru și asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională
- b) certificatului de membru și a avizului anual
- c) certificatului de membru

76. În placentă praevia centrală:

- a) Orificiul intern al colului este acoperit parțial de placentă.
- b) Marginea placentei este la marginea orificiului intern al colului.
- c) Orificiul intern al colului este acoperit în totalitate de placentă.

77. Hemoragia în ginecologie reprezintă pierderea de sânge:

- a) Pe cale vaginală.
- b) Pierderea de sânge menstrual.
- c) Pe cale anală.

78. Printre bazinele viciate se numără, cu excepția:

- a) Bazinul eutocic.
- b) Bazinul acondroplazic.
- c) Bazinul cifotic.

79. Vârsta gestațională se calculează (cu aproximație):

- a) De la data apariției primelor semne de sarcină.
- b) Din momentul concepției.
- c) De la data apariției corpusculilor Montgomery.

80. Cardiotocografia înregistrează:

- a) Frecvența cordului fetal, precum și relația dintre acesta și contracția uterină.
- b) Mișcările fetale și pulsul matern.
- c) Bătăile cardiace materne.

81. Alimentul ideal al nou născutului sănătos este:

- a) Laptele matern.
- b) Laptele praf.
- c) Alimentația mixtă (lapte praf și lapte matern).

82. Activitatea sexuală în sarcină:

- a) Nu este permisă doar în trimestrul III.
- b) Trebuie să decurgă normal în primele două trimestre, fiind mai redusă în ultimul trimestru.
- c) Este interzisă în sarcină.

83. Examenul citologic Babeș - Papanicolaou:

- a) Evidențiază agenții etiologici care produc infecții.
- b) Permite rar identificarea agentului etiologic în cervicite.
- c) Reflectă modificările patologice celulare din infecțiile cervicale.

84. Examenul citologic Babeș-Papanicolaou este indicat astfel:

- a) Doar dacă există suspiciunea de cancer de col uterin.
- b) Doar la femeile care au născut.
- c) O dată pe an, la femeile cu vârsta de peste 18 ani care au activitate sexuală.

85. Avizul anual se acordă:

- a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă 3 luni
- b) fără a fi necesară încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională
- c) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv

86. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emiterea documentelor necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană se realizează de către:

- a) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
- b) Ministerul Educației
- c) Ministerului Sănătății

87. Endometrioza este asociată cu:

- a) Infertilitatea.
- b) Tulburări urinare.
- c) Sarcina gemelară.

88. În patologia excesului de volum fetal pot fi implicați mai mulți factori:

- a) Multiparitatea.
- b) Obezitatea maternă.
- c) Nașterea prematură.

89. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate:

- a) oricărei persoane interesate
- b) cu aprobarea conducătorului unității medicale
- c) dacă legea o cere în mod expres

90. Recoltarea secrețiilor vaginale pentru examenul bacteriologic și parazitologic are ca scop/indicații:

- a) Depistarea agenților patogeni care produc infecții vulvovaginale.
- b) Depistarea chisturilor de ovar, fibroamelor sau altor tipuri de tumori.
- c) Depistarea celulelor care pot produce leziuni tumorale maligne.

91. Icterul fiziologic al nou-născutului:

- a) Apare la 2 - 4 zile de la naștere sub forma unei colorații galbene a tegumentelor.
- b) Se manifestă prin stare generală alterată, ficat și splină de dimensiuni mari.

- c) Apare la 6 - 8 zile de la naștere sub forma unei colorații galbene a mucoaselor.

92. Pelvimetria internă apreciază:

- a) Unghiul format de ramurile descendente ale oaselor pubiene.
b) Suplețea perineului și elasticitatea pereților vaginali.
c) Starea membranelor și prezentația.

93. Concentrația HCG (Coriogonadotropina) în sângele și urina gravidei:

- a) Are valori egale pe tot parcursul sarcinii.
b) Crește rapid în primele 80 de zile.
c) Scade în primul trimestru.

94. Femeile infectate cu virusul HIV:

- a) Se recomandă o relație sexuală monogamă.
b) Pot dona plasmă, dar nu pot dona sânge.
c) Sarcina este benefică în evoluția bolii.

95. Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de către:

- a) Ministerul Educației
b) Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
c) organizațiile sindicale.

96. După montarea unui sterilet, primul control trebuie efectuat:

- a) La 5 ani de la inserție.
b) La 3 ani de la inserție.
c) La un an de la inserție.

97. În sarcină, la examenul cu valve se pot evidenția:

- a) Ovarele.
b) Secreții patologice în vagin.
c) Membranele fetale.

98. În primul trimestru de sarcină, estrogenii:

- a) Sunt produși de corpul galben.
b) Sunt produși de citotrofoblast.
c) Sunt produși de suprarenală.

99. Administrarea de calciu în sarcină este uneori periculoasă deoarece poate:

- a) Declanșa contracții uterine.
b) Duce la dezechilibre hormonale.
c) Declanșa afecțiuni renale fetale și materne.

100. Metroragia la fetițe este cauzată de:

- a) Infecții digestive repetate.
b) Corpi străini intravaginali ocazionali, vulvită, tumori ovariene.
c) Fibroame uterine.